I. Abtheilung.

Falter oder Tagschmetterlinge.

(Papiliones).

Erste Gattung.

Scheindornraupen. (Larvae pseudospinosae).

Sie haben statt der schaligen Dornen nur fleischige, kegelförmige, mit kurzen Haaren besetzte Erhöhungen von ungleicher Zahl, sieben oder neun auf jedem der mittleren Ringe, zwei merklichere an den Seiten des Halses.

Puppe. (Chrysalide).

Sie hängt gestürzt; ist vorn beinahe stumpf, auf dem Rücken aber meistens mit erhabenen Punkten besetzt.

---

1. Pap. Maturna. Abbißfalter, kleiner Maivogel.

In mehreren Gegenden Deutschlands. März, April, Mai. †]. Kopf, Leib und die Dornen sind schwarz; über dem Rücken und an jeder Seite befindet sich ein aus großen schwefelgelben Punkten bestehender Streif; der Rückenstreif ist durch eine schwarze Linie getheilt. Zitterpappel (Populus tremula), Wollweiden (Salix capraea), Buchen (Fagus sylvatica), Wegerich (Plantago) und dem Teufelsabbiß (Scabiosa succisa).

Puppe]: Stumpf, grünlichweiß, gelb und schwarz gefleckt, mit sieben Reihen gelber Knöpfchen an dem Hinterleibe. Entwickelung. In 14 Tagen.

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202207151028-0