

er sich an dieselben klammerte und den Coendu, welcher fortwährend kläglich schrie, emporhob, sodaß er in der Luft schwebte. Der Marder schleuderte nun sein Opfer hin und her und ließ es plötzlich bei einer Wendung los, sodaß der Coendu auf den Rücken zu liegen kam. Sofort sprang der Marder von dem Aste herunter, und bevor der von dem Falle betäubte Coendu sich noch hatte auf die Füße wenden können, saß ihm sein schlauer Feind auch schon an der Brust, hatte seine Krallen in dieselbe getrieben und zerfleischte ihn mit seinen scharfen Zähnen jämmerlich. Ohnmächtig wehrte sich das Thier, und in kurzer Zeit lag es regungslos da. So interessant das uns gebotene Schauspiel auch war, konnten wir doch nicht umhin, den Räuber zu strafen, und ohne Zögern fielen wir über den in größtem Appetit schmausenden Marder her. Er wollte sich zur Wehre setzen und knirschte, das Gebiß zeigend, aber während er seine Aufmerksamkeit auf eine Seite richtete, streckte ihn eine wohlgezielte Kugel zu Boden.“

### Aguti, Paka und Wasserschwein.

Die Halbhuser bilden eine kleine, fast nur in Südamerika heimische Gruppe der Naget und charakterisiren sich, wie schon angedeutet, durch die besondere Fußbildung. Die Vorderfüße bestehen aus vier Zehen mit kleiner, einen Plattnagel tragender Daumenwarze und die dreizehigen Hinterfüße sind mit hufähnlichen Klauen versehen. Der Schwanz ist bei allen Arten kurz und unbehaart. Zu den Gattungen mit mehrwurzeligen Backenzähnen gehört das Aguti, welches sich wie alle Halbhuser von Gras, Blättern und hervorgewühlten Wurzeln nährt; es wohnt weniger in unterirdischen Bauen, sondern zieht hohle Bäume und Felspaltten als Aufenthalt vor, in dem es wie sein Verwandter, das Meerschweinchen, mehrmals im Jahre 6—8 blinde Junge wirft, also demselben an Fruchtbarkeit nicht nachsteht. Theils des Fleisches wegen, aber hauptsächlich um seine verderblichen Angriffe auf die Anpflanzungen zu vermindern, wird ihm bedeutend nachgestellt, es ist aber demungeachtet nicht auszurotten. In Brasilien, Paraguay und Guyana ist das gemeine Aguti außerordentlich häufig und überfällt gleich in Gesellschaften von 20 Stück die besonders in der Nähe der Wälder angelegten Pflanzungen. Es zeichnet sich hauptsächlich durch die höheren Hinterfüße vor den anderen Arten aus und nimmt auch gewöhnlich seine