

zen Flecken der Federn, den Fischen wie Fliegen vorkommen, so daß sie darnach schnappen.

Eine andere kleinere Gattung des Trappen erreicht nur die Größe einer Ente und wird daher der Zwergtrappe genannt. Er ist an dem Kopfe und an der Kehle glatt und wird hauptsächlich in Frankreich angetroffen. In der Nahrung kommt dieser Zwergtrappe dem vorigen Trappen gleich; das Fleisch, so wie die Eier, sind von einem vortrefflichen Geschmacke.

Von einigen noch andern hühnerartigen Vögeln, werden wir Euch, liebe Kinder, bei unsrer nächsten Zusammenkunft das Wesentlichste mittheilen; für heute mag es genug seyn.

---

## Fünfzehnte Unterhaltung.

T a b. VIII.

### D e r P f a u.

An dem folgenden Abende empfangen der Baron und sein Freund der Pastor ihre wißbegierigen kleinen Zuhörer, mit der Erklärung, daß, dem gegebenen Versprechen gemäß, die diesmalige Fortsetzung der abgebrochenen Unterhaltung vorzüglich noch einigen in das Geschlecht der Hühner gehörenden Vögel gewidmet seyn sollte, welche zwar seit geraumer Zeit bei uns als einheimisch gezogen werden, aber eigentlich ebenfalls Fremdlinge sind.