

V o g e l.

Tafel I.

Raubvögel.

Der Geier. Schnabel hakenförmig gekrümmt, die Wachsheit unbedeckt. Kopf entweder nackt, oder mit Flaum bedeckt. Hauptnahrung der Geier ist Aas, ihr Seh- und Geruchsorgan ungemein scharf. Sie sind träge und feig, können aber hoch fliegen. In Schaaren bewohnen sie warme Länder, denen sie sehr nützlich sind, indem sie alles Aas aufzehren.

- a) Der ägyptische Aasgeier. (Vultur oder Cathartes Percnopterus) Die Schwingen sind schwarz, außerdem ist er weiß, Kopf und Kehle nackt und gelblich. Die Länge erreicht nicht 2 1/2'. Die Jungen sind braun. In Südeuropa, Afrika und dem Orient kommt er in Schaaren vor und wird allenthalben in den Städten geduldet, indem er alles Aas aufzehrt. Man hält ihn deshalb besonders in Aegypten als ein heiliges Thier.
b) Der große graue Geier, gemeine Geier (V. cinereus) dunkelbraun, der Oberhals nackt und bläulich, den Scheitel deckt eine wollige Federhaube. Südeuropa und Afrika sind seine Heimat, er streift aber auch zuweilen nach Deutschland. Er ist 4' lang, die Flügel spannen 9'.
c) Der Kondur. (V. Gryphus). Schwarz mit weißem Halsfragen, Männchen mit einem fleischigen Kamm, ober und unter dem Schnabel. Die Flügel klaffern 11'. Er bewohnt die amerikanischen Cordilleren, fliegt erstaunlich hoch und greift fast auch große Thiere an.
Der Geieradler (Gypaëtus)
d) Der Bart- oder Lämmergeier, (G. barbatus), orangefarben mit braunem weißgestricheltem Rücken und Flügeln. Unterm Kinn befinden sich vorwärts stehende Borsten. Er findet sich in den Gebirgen der Schweiz, Tyrols und des südlichen Europas, ist ein gewaltiger Räuber, der Gemsen, Ziegen, Schaafe und andere Thiere anfällt und selbst schon Kinder geraubt hat. Seine Flügel klaffern 10', deshalb fliegt er leicht und stößt aus erstaunlicher Höhe auf das ruhig weidende Thier pfeilschnell herab.
e) Der Kranichgeier. Der Sekretär (Gypogeranus serpentarius). Läufe ungemein lang, Behen dagegen kurz, der Schwanz keilförmig. Blaugrau, am Hinterkopf mit einem schwarzen Federbüsch. Er ist 3' lang und bewohnt die ebenen Steppen des südlichen Afrikas, fängt in schnellem Laufe Schlangen, Eidechsen zc.

Tafel II.

Die Falken und Adler. (Falco).

Haben einen kurzen von der Wurzel an gebogenen Schnabel meist mit gelber Wachsheit. Die Behen mit starken krummen und spitzigen Krallen bewaffnet.

- a) Der Steinadler, Goldadler (Falco fulvus). Lauf ganz befiedert, Gefieder braun. Nach Ansehen Muth und Stärke gilt dieser Adler als König der Vögel, er bewohnt die waldigen Gebirge Europas und stößt auf Alles, was er bezwingen kann, am liebsten auf Rehe, Hasen und Federwildpret. Er horstet auf hohen Bäumen oder Felsen und man findet in seinem Nest selten mehr als 2 Junge, die von den Alten reichlich gefüttert werden. Das Weibchen ist 3 1/2' lang und etwas größer als das Männchen, aber nicht so muthig wie dieses.
b) Der Seeadler (F. albicilla). Lauf nur halb gefiedert. Gefieder graubraun, Schwanz weiß. Er ist so groß wie der Steinadler, bewohnt ganz Europa, lebt aber gefelliger, als jener, nährt sich im Sommer von Schwimmvögeln und Fischen, im Winter aber von allerlei Wildpret.
c) Der Schlangenadler (F. brachydactylus) Behen und Krallen kurz, oben braun unten weißlich, Wachsheit und Füße bläulich. Länge 2 1/2'. Er lebt im südlichen Europa und nährt sich von Amphibien.
d) Der rothe Milan Weihe, Gabelweihe. (F. milvus) 2' lang, rostfarben, Kopf weißlich und dunkel gestrichelt, der Schwanz gabelförmig. Er hat einen langsamen schönen Flug, dreht sich stundenlang ohne Flügelschlag im Kreise umher und kann sehr hoch emporsteigen. Er fängt Hühner, junge Gänse, Mäuse, Frösche, ist aber träge und feig. Er nistet auf hohen Bäumen.

Tafel III.

- a) Die Kornweihe (F. Pygargus) Schwanz etwas gebändert, das alte Männchen aschgrau mit weißer Brust, Weibchen und Junge oben dunkelbraun und unten weißlich. Sie lebt in ganz Europa und fängt Mäuse und sitzende Vögel.
b) Der Bussard, Mäusefalk. (F. Buteo) Lauf nackt und gelb, das Gefieder braun und unten weiß gefleckt. Der Bussard ist einer unserer gemeinsten Raubvögel, der im Herbst in Schaaren wegzieht und im Frühling wiederkehrt, die von Norden kommenden bleiben in gelinden Wintern bei uns. Obwohl träg und tölpisch ist er ein nützlich Raubthier, da er sich von Feldmäusen nährt.

O I S E A U X.

Table. I.

Oiseaux de proie.

Le vautour. Le bec crochu, la cire découverte, la tête nue, ou couverte de duvet. Les vautours se nourrissent principalement de charognes; ils ont la vue et l'odorat extrêmement fins; ils sont lâches et lents, mais ils s'élèvent à une grande hauteur. Ils habitent par troupes les pays chauds auxquels ils rendent de grands services en les purifiant des cadavres.

- a) Le Percnoptère d'Egypte (Vultur ou Cathartes Percnopterus) Les plumes noires, le reste blanc; la tête et la gorge nues et jaunâtres. Il n'a pas 2 1/2 pieds de long. Les petits sont bruns. Dans l'Europe méridionale, dans l'Afrique et dans l'Orient il se trouve par troupes, et on le tolère partout dans les villes, parcequ'il mange toutes les charognes. En Egypte surtout on le respecte comme un oiseau sacré.
b) Le grand Vautour fauve, le Vautour commun (V. cinereus). Brun foncé, la partie supérieure du cou nue et bleuâtre, le sommet de la tête couvert d'une huppe laineuse. Il habite l'Europe méridionale, l'Afrique, quelquefois même il vient jusqu' en Allemagne. Il a 4 pieds de long, son envergure est de 9 pieds.
c) Le Condor (V. Gryphus). Noir, le collier blanc; le mâle a des caroncules au dessus et au dessous du bec. Son envergure est de 11 pieds. Il habite la Cordillère des Andes, s'élève à une hauteur prodigieuse et attaque même les grands animaux.
Le Griffon (Gypaëtus).
d) Le vautour des agneaux. (G. barbatus) est d'un fauve clair, les ailes brunes avec des lignes blanches ainsi que le dos. Sous le bec un pinceau de soies. Il se trouve dans les montagnes de la Suisse, du Tyrol et de l'Europe méridionale. C'est un rapace puissant, qui attaque les chamois, les chèvres, les agneaux et qui a même quelques fois enlevé des enfans. Son envergure a 10 pieds de long, ce qui fait qu'il s'élève facilement dans les airs et qu'il se précipite avec la rapidité d'une flèche sur les animaux qui paissent en sécurité.
e) Le Vautour gruyer, Secrétaire (Gypogeranus serpentarius). Tarses très longs, doigts courts, la queue en forme de coin. Bleu grisâtre, à la partie postérieure de la tête une huppe noire. Il a 3 pieds de long et habite les landes desertes de l'Afrique méridionale; il fait en courant la chasse aux serpents, aux lézards etc.

Table. II.

Les Faucons et les aigles (Falco).

Bec court, courbé dès sa base, cire ordinairement jaune. Doigts armés d'ongles pointus crochus et puissans.

- a) L'Aigle doré, l'aigle impérial (Falco fulvus). Tarses emplumés, manteau brun. Remarquable par la noblesse de son port, par son courage et par sa force, cet aigle passe pour être le roi des oiseaux; il vit dans les montagnes boisées de l'Europe et chasse tous les animaux qu'il peut vaincre, surtout les chevreuils, les lièvres et les oiseaux. Il établit son aire sur les arbres élevés ou sur les rochers; on n'y trouve guère plus de 2 petits, que les parens nourrissent abondamment. La femelle a 3 1/2 pieds de long et est un peu plus grande que le mâle, mais sans l'égalier en courage.
b) L'aigle pêcheur (F. albicilla). Tarses emplumés à moitié, manteau brun grisâtre, queue blanche. Aussi grand que l'aigle doré, il habite toute l'Europe, est plus sociable que ce dernier, se nourrit en été d'oiseaux aquatiques et de poissons, en hiver de toutes sortes de gibier.
c) La Buse (F. brachydactylus). Les doigts et les ongles courts. Brun en dessus, blanchâtre en dessous. Cire et pieds bleuâtres. Longueur 2 1/2 pieds. Habite le Sud de l'Europe et se nourrit d'amphibies.
d) Le Milan rouge (F. milvus) 2 pieds de long, couleur de rouille, tête blanchâtre, rayée; queue fourchue. Son vol et beau et lent; il s'élève très haut dans les airs et s'y soutient tranquillement, pendant des heures entières, en décrivant des cercles. Il saisit des poules, de petites oies, des souris, des grenouilles; mais il est lâche et paresseux. Il construit son nid sur les arbres élevés.

Table. III.

- a) Le Pygargue (F. Pygargus) queue un peu rayée; le mâle, quand il est âgé, est cendré, gorge blanche, la femelle et les petits brun foncé en dessus, et blanchâtres en dessous. Il habite toute l'Europe et prend des souris et des oiseaux sur la couvée.
b) Le Bussard (F. Buteo). Tarses nus et jaunes, le manteau brun avec des taches blanches en dessous. C'est un de nos rapaces les plus communs; il émigre en automne par bandes et revient au printemps; ceux qui viennent du nord, restent chez nous si l'hiver n'est pas rigoureux. Quoique paresseux et stupide il ne laisse pas d'être utile en mangeant des souris champêtres.