schilde und weiß gefleckten Seiten. Auf Eichen, Birnbäumen, Buchen, Himbeeren; verpuppt sich im Juni in der Erde und entwickelt sich im August.

**Noctua Fimbria**, der Saumfleck. S. März.

**Noctua Euphorbiae**, Wolfsmilcheule. Auf Wolfsmilch; verpuppt sich im Juni in einem Gespinnste und entwickelt sich nach 4 oder 5 Wochen.

**Noctua Chrysitis**, der Messingglanz, Hanfnesseleule, Kupferflügel, Goldeule, Messingeule, Messingvogel. Ziemlich selten. Raupe zwölffüßig, grün, mit weißen Längslinien und gleichfarbiger Seitenstrieme. Im Frühling und Herbst auf Brennnessel, Hanfnessel, Andorn, Münze, Klette, Eselsdistel. Verpuppt sich im Juni in einem weißen Gespinnste und entwickelt sich nach **14 Tagen.**

**Noctua Stabilis, Noct. Cerasi**, Lindeneule. Raupe grün mit drei gelben Linien, hinter dem grünen Kopfe ist eine gelbe Querlinie, auf dem elften Ringe desgleichen. Im Mai und Juni auf Linden, Eichen, Buchen, Ulmen, Pappeln, Obstbäumen. Verwandlung im Juni in der Erde und entwickelt sich im Frühjahr.

**Noctua Exclamationis**, Kreuzkrauteule. Raupe schmutzig glänzend braun mit blasser Rückenlinie. Auf Kreuzkraut und an Graswurzeln; überwintert; verpuppt sich in diesem Monate in der Erde und entwickelt sich nach **14 Tagen.**

**Noctua Coenobita, Bomb. Coenobita, Noct. Panthea.** Auf Tannen. Verpuppt sich im Juni in einem braunen, festen Gespinnste am Fuße der Stämme und entwickelt sich im Juli.

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00000212