Aëmauta Podalirius, der Segelvogel. S. Juni.

Tachyptera Brassicae, der Kohlweißling. S. Juni.

Tachyptera Rapae, der Rübweißling.

Tachyptera Napi, der Rübsaatfalter. Raupe feinhaarig, mattgrün, an den Seiten heller, mit rothgelben Luftlöchern, weißen Warzen und schwarzen Punkten. Auf allerhand Kohl und Rübensaat, Kresse, Levkojen; verpuppt sich im August und entwickelt sich nach 14 Tagen, Spätlinge überwintern als Puppe und entwickeln sich im Frühjahre.

Tachyptera Cardamines, der Aurorafalter. S. Juni.

Tachyptera Cardui, der Distelfinke. S. Juni.

Tachyptera Antiopa, der Trauermantel. S. Juni.

Tachyptera Polychloros, der große Fuchs. S. Juni.

Tachyptera Urticae, der kleine Fuchs. S. Juni.

Tachyptera C. album, das weiße C. S. Juni.

Tachyptera Atalanta, der Admiral. S. Juni.

Tachyptera Sybilla. S. Juni.

Tachyptera Levana die braune Landkarte. S. Juni.

Tachyptera Prorsa, die schwarze Landkarte. S. Juni.

Tachyptera Lathonia, die kleine Perlmutter. S. Juni.

Hesperia Quercus, der kleine Blauschiller. S. Mai.

Hesperia Icarus. S. Juni.

Tachyptera Alexis. S. Juni.

Tachyptera Daplidice, der Kreßweißling. S. Juni.

Tachyptera Rumina. S. Juni.

Tachyptera Briseis. S. Juni.

Tachyptera Euphrosyne. S. April. Verpuppt sich in diesem Monate und entwickelt sich im August.

Tachyptera Hyale. S. April.

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00000212