

I. Tesseralsystem. II. Tetragonalsystem. III. Rhombisches System. IV. Klinorhombisches System. V. Klinorhomboidisches System. VI. Hexagonalsystem.



42. Idealer Durchschnitt durch die feste Erdrinde.

I. Neptunische Gebirgsmassen.

A. Grauwacken- B. Steinkohlen- C. Zechstein- D. Trias- E. Jura- F. Kreide- G. Molasse-Gruppe. H. Alluvium. J. Diluvium.

S. S. S. S. Krystallinische Schiefergesteine.

II. Plutonische Gebirgsmassen.

a. Porphyr. b. Grünstein. c. Diabas. d. Glimmerporphyr. e. Quarzporphyr. f. Melaphyr. g. Basalt. h. Trachyt. i. Lava. α. α. Erzgänge. β. Körniger Kalkstein.

Zeichnungen von E. Fröhlich.

43.



Die Baumannshöhle am Harz. Durchschnitt.

45.

Der Logon-Rock in Cornwallis.



44.

Durchschnitt des Meißners in Hessen.
B. B. Basalt. N. N. N. Neptunische Schichten.

46.



Die Fingalsgrotte auf der Insel Staffa.

Druck von C. Wolf & Sohn. München, Holzschnitt und Verlag von Braun & Schneider.

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/21842