rändern, die orangerothe Zeichnung bildet bald eine Binde, bald bloße längliche Flecken; die Unterflügel mit einem kurzen Schwänzchen. Unterseite olivengrün, mit orangefarbigen, blauen und schwarzen Flecken und Linien. Raupe auf Schlehen, Zwetschgen, Birken und Ulmen. Juni und Juli, besonders gerne auf Schlehenbüschen.

III. Zygaena. Zygänen.

Diese Schmetterlinge sind, obwohl ihrer Gestalt nach den Abendschwärmern sehr ähnlich, ihrer Lebensweise nach doch eher Tagschmetterlinge zu nennen. Ihre Fühler sind gegen das Ende keulenförmig verdickt, die Flügel schmal, die Vorderflügel meist stahlblau oder metallisch-grün mit rothen Flecken. Die Raupen sind kurz und dick, schwach behaart, und leben auf krautartigen Pflanzen. Um sich zu verpuppen machen sie ein pergamentartiges gelbes Gespinnst, welches sie an Pflanzenstengel anheften.

Zygaena Meliloti. Melilotenzygäne.

Vorderflügel grün, mit fünf rothen Flecken. Hinterflügel karminroth, mit breitem graulichem Rande. Leib blau. Raupe auf Klee. Flugzeit: Juli bis September. Auf lichten Waldstellen.

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/21984