Bombyx Hebe. Englischer Bär, weiße Birnenmotte.

Vorderflügel weiß, mit sammtschwarzen breiten Binden und Flecken. Hinterflügel carminroth, schwarz gefleckt. Körper schwarz; Nacken, der Kragenrand und die ersten sechs Leibesringe an den Seiten carminroth. Raupe auf Gras, Salat 2c. Schmetterling im Juni.

VII. Noctua. Eule.

Die hierhergehörigen Schmetterlinge sind eigentliche Nachtschmetterlinge, welche bei Tage stille sitzen. Sie haben großentheils einfach gefärbte Unterflügel (mit Ausnahme der Ordensbänder) und verworren gezeichnete braun-grauscheckige u. s. w. Oberflügel. Die Raupen sind glatt, seltener behaart und leben auf Kräutern und Bäumen, einige auch in den Stengeln und Wurzeln. Sie verpuppen sich in einem Gespinnst.

Noctua Pronuba. Große Nachteule, Brautjungfer, Läufer, Rosenvogel, Bandeule.

Vorderflügel leberbraun, hell und braun wellenförmig gewölkt, an der Grundhälfte des vordern Randes hellgrau, auf der Mitte der Flügel mit einer 8 förmigen Zeichnung. Hinterflügel orangegelb, vor dem Außenrande eine breite schwarze Binde. Brustschild von der

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/21984