gelbbräunlich. Raupe auf Weißdorn, Schlehen, Zwetschgen. Der Schmetterling ist ziemlich selten und findet sich in den Monaten Juli und August.

VIII. Geometra. Spanner.

Sämmtlich Schmetterlinge von mäßiger Größe und theilweise lebhafter Färbung. Ein charakteristisches Merkmal in der Zeichnung ihrer Flügel ist, daß Striche, Punkte u. s. w. immer der Quere nach verlaufen. Die Fühler der Männchen sind bei den meisten Arten gefiedert. Die Raupen sind lang und dünn, haben keine eigentliche Bauchfüße, weßhalb sie einen eigenthümlichen Gang haben, mit den Vorderfüßen halten sie sich fest und schieben den Hinterleib nach. In der Ruhe halten sie sich mit den hintern Füßen fest und strecken den übrigen Leib gerade in die Luft, so daß man sie leicht für abgebrochene Aestchen halten kann, zumal ihre Farbe häufig mit der des Holzes übereinstimmt. Sie verpuppen sich in einem leichten Gespinnst zwischen Blättern oder unter der Erde.

Geometra alniaria. Erlenspanner, Nageflügel, Gelberübenschnitz, Brettspiel.

Flügel stark ausgezackt, angenehm gelb, braun punktirt, nach außen orangenbraun schattirt. Oberflügel mit

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/21984